## Ministry of Health and Population Preventive Medicine and Public Health Sector Central Administration of Public Health General Directorate for Communicable Disease Control



# أهم التحديثات التي وردت في الأدلة الارشادية للوقاية من مرض السعار أغسطس ٢٠٢٥

- 1. العينات التي يتم سحبها من الحالة المشتبه اصابتها بمرض السعار هي (لعاب ، سيرم) ويتم سحب عينة اللعاب على ٣ فترات خلال ٢٤ ساعة.
  - ٢. الإبلاغ عن واقعات العقر الجماعي بداية من ٣ حالات فأكثر.
- ٣. جرعات الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوان أصبحت ٤ جرعات فقط بدلا من ٥ جرعات وبنفس المسافات البينية للأربع جرعات (٢٠،٧٠٠).
  - ٤. مهما تأخرت الحالة عن أي جرعة وحضرت للمركز للإستكمال بدون (عقر جديد) يتم استكمال الجرعات بغض النظر عن فترة الغياب.
- ٥. في حالة وجود حالة تعاني من نقص المناعة يتم تقديم ما يثبت ذلك وبناءا عليه يتم إعطاء (جرعة خامسة) في اليوم الـ ٢٨ من تاريخ الجرعة الأولى.

## في حال إمكانية متابعة الحيوان العاقر:

- في حالة الحضور بعد العقر او الخدش مباشرة يتم إعطاء الجرعة الأولى مع التنبيه على الحالة بالقيام بمتابعة الحيوان لمدة ١٠ أيام من تاريخ التعرض للعقر او الخدش حيث انه عند عدم حدوث اى تغيرات سلوكية على الحيوان خلال فترة المتابعة يتم إيقاف العملية التطعيمية في نهاية اليوم العاشر
  - في حالة الحضور بعد مرور عشرة أيام من تاريخ التعرض للعقر أو الخدش يتم سؤال المريض عن حدوث أي تغيرات سلوكية للحيوان خلال فترة المتابعة، وإذا تم الإفادة بعدم وجود أي تغيرات سلوكية لا يتم إعطاء اللقاح.

### ٧ الجرعات التنشيطية

- في حالة الحيوان الضال يتم إعطاء عدد ٢ جرعة تنشيطية (الأولى اليوم صفر) والثانية (اليوم الثالث) في حالة تلقي جرعات اللقاح كاملة وذلك بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الجرعة الرابعة.
- يتم تأجيل الجرعات التنشيطية لحين الانتهاء من متابعة الحيوان لمدة ١٠ أيام من تاريخ التعرض للعقر او الخدش من الحيوان وفي حالة عدم حدوث أي تغيرات سلوكية لا يتم التطعيم.

#### ٨. المصل:

- يتم إعطاء المصل للحالة المستحقة طبقا لتقييم الجرح مرة واحدة خلال ٢٤ ساعة وبحد اقصىي ٧ أيام من تاريخ الجرعة الأولى ولا يتم اعطاءه للحالة مرة أخرى حتى لو تعرضت لعقر جديد وكان الجرح يستحق للمصل.
  - في حال تعذر إعطاء المصل حول موضع العقر او الخدش في الجسم يتم اعطاءه كاملا في أقرب عضلة لموضع الجرح.
  - في حال تزامن إعطاء المصل مع تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية يتم تأجيل التطعيم (٤ اشهر علي الاقل)، وفي حال التزامن مع تطعيم الجديري المائي يتم تأجيل التطعيم (٣ اشهر علي الأقل) مع الالتزام بإعطاء المصل (الاولوية للمصل لأنه منقذ للحياة).
    ٩. في حالة تعرضت الحالة لعقر جديد وكان لها عقر سايق تلقت بسبيه جرعات:

    - تلقت أربع جرعات في الواقعة الأولى ثم ترددت الحالة على المركز قبل مضي ٣ شهور من تاريخ الجرعة الرابعة 💎 لا يتم التطعيم.
  - تلقت أربع جرعات في الواقعة الأولى ثم ترددت الحالة على المركز بعد مضي ٣ شهور من تاريخ الجرعة الرابعة → تطعيم جرعات تنشيطية.
- تلقت ٣ جرعات في الواقعة الأولى ثم ترددت الحالة على المركز قبل مضى ٣ شهور من تاريخ الجرعة الثالثة → تطعيم الجرعة الرابعة (استكمال)
  - تلقت ٣ جرعات في الواقعة الأولى ثم ترددت الحالة على المركز بعد مضي ٣ شهورمن تاريخ الجرعة الثالثة 🔻 تطعيم جرعات تنشيطية.
    - تلقت جرعة او جرعتين في الواقعة الأولى ثم ترددت الحالة على المركز → (استكمال جرعات).